

Bulletin technique N° 12 du 21/12/95

COLZA

Charançons du bourgeon terminal: Traitement de rattrapage.

COLZA

CHARANÇONS DU BOURGEON TERMINAL

Situation sur les infestations larvaires :

Les conditions climatiques d'Octobre ont permis une bonne protection insecticide contre le Charançon du bourgeon terminal (période du 12 au 20 Octobre).

Les comptages effectués ces jours derniers confirment bien l'importance de la nuisibilité du Charançon du bourgeon terminal en Auvergne. En effet, en situations non protégées en Octobre (selon nos indications), les infestations larvaires sont localement importantes (de l'ordre de 50 à 80 % de pieds porteurs de larves). Les larves sont nombreuses et déjà bien développées. Le niveau des infestation en larves de Grosses Altises est bas, bien en accord avec les faibles captures de l'automne.

O Préconisation

Apprécier en urgence le niveau d'infestation larvaire par un comptage (observation et dissection des plantes) afin d'agir rapidement par un traitement de rattrapage.

Il faut signaler que l'efficacité de ce type d'intervention est souvent irrégulière (la meilleure stratégie étant la lutte sur les adultes de Charançon avant la ponte : suivi des Avertissements Agricoles.

- Seuils d'intervention :

- Charançons du bourgeon terminal : 20 % de plantes infestées.
- Grosses Altises : 70 % de plantes infestées.

- Produits:

- Oléoparathion éthyl : 350 g de m.a;/ha.
- Oléoparathion méthyl: 400 g de m.a./ha.

de la Protection des Végétaux Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES Tél: 73. 42. 14. 83 - Fax: 73. 90. 83. 70